

น้ำยาอะเรย์ กันพื้นลื่น คิวคิก Crocodile Anti Slip Quick



อะเรย์
Innovation for Your Family's Happiness
TILING INNOVATION

กันลื่นเมื่อพื้นกระเบื้องเปียกน้ำ

คุณสมบัติ

กันพื้นลื่นเมื่อพื้นกระเบื้องเปียกน้ำ ภายใน 5 นาที ใช้ได้กับกระเบื้องทุกชนิด ยกเว้นกระเบื้องเคลือบแก้ว ไร้สารตกค้าง เหมาะสำหรับห้องน้ำ หรือพื้นที่เปียกน้ำ ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร หรือ บริเวณที่เสี่ยงต่อการลื่น สามารถทำความสะอาดพื้นได้ตามปกติ



ข้อแนะนำการใช้

การเตรียมพื้นผิว

ทำความสะอาดพื้นให้สะอาด ปราศจากคราบสกปรก และคราบมัน เช็ดให้แห้งสนิท

อัตราส่วนผสม

ไม่ต้องผสมน้ำ

การใช้งาน

1. ทำความสะอาดพื้นให้สะอาด เช็ดให้แห้งสนิท
2. ทดลองพ่นในพื้นที่เล็กๆ ก่อน เพื่อทดสอบผลของน้ำยาที่มีต่อสีของกระเบื้องสีของกระเบื้องอาจจางลง
3. พ่นน้ำยากันลื่น ลงบริเวณที่ต้องการ (อาจใช้ฟองน้ำช่วยเกลี่ย เพื่อให้น้ำยาครอบคลุมได้ทั่วถึง)
4. รอ 5 นาที เพื่อให้น้ำยาทำปฏิกิริยา (กระเบื้องบางชนิดอาจใช้เวลาในการทำปฏิกิริยานานกว่า 5 นาที อาจทิ้งน้ำยาให้ทำปฏิกิริยานานขึ้นแล้วค่อยล้างออก)
5. หมั่นทดสอบอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย 6 เดือน/ครั้ง หากพบว่าประสิทธิภาพลดลง ให้ทำซ้ำ (รับรองผลเฉลี่ย 6 เดือน)

ข้อมูลทางด้านเทคนิค (Technical Data)

Emulsions titanium powder
Polyethylene emulsion
Resin Solution
PH 4.5

ข้อควรระวัง

- ควรทดสอบประสิทธิภาพในพื้นที่เล็กๆ ก่อน
- สวมถุงมือและแว่นป้องกันตลอดเวลา และควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง
- สีของกระเบื้อง และความมันวาวอาจลดลงเล็กน้อย เนื่องจากปฏิกิริยาทางเคมีของ น้ำยาอะเซ กันพื้นลื่น อาจทำให้กระเบื้องที่มีสีเข้ม เช่น สีดำ หรือสีน้ำเงินแก้อาจจางลง (ควรทดสอบก่อนว่าผลที่ได้เป็นที่พอใจหรือไม่) แต่การกันพื้นลื่นยังคงให้

ประสิทธิภาพ

เหมือนเดิม

- ไม่ควรเทน้ำยาอะเซ กันพื้นลื่น ลงบนกระเบื้องโดยตรงเด็ดขาด จะต้องเทลงบนฟองน้ำ แล้วใช้ฟองน้ำทาบบนพื้นผิวเท่านั้น

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

- **ทางการเข้าตา** ล้างตาด้วยน้ำเปล่าจำนวนมากทันที และกรอกตาขึ้นลง หากใส่คอนแทคเลนส์ ควรถอดออกอย่างระมัดระวัง และล้างตาด้วยน้ำเปล่าต่ออย่างน้อย 20 นาที และควรปรึกษาแพทย์
- **ทางการสูดดม** เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังที่โล่งและอากาศถ่ายเท หากยังมีควันพุ่งจากสารเคมี ควรสวมใส่หน้ากากในกรณีหมดสติ ควรจัดท่าทางผู้ป่วยอยู่ในท่าที่เหมาะสม ปลดกระดุมเสื้อหรือเนคไทด์ ควรเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปในสถานที่ปลอดภัยโปร่ง อากาศถ่ายเท และปรึกษาแพทย์ฉุกเฉินทันที
- **ทางผิวหนัง** ล้างสิ่งปนเปื้อนจากผิวหนังด้วยน้ำจำนวนมาก ล้างสารที่ปนเปื้อนเสื้อผ้าด้วยน้ำ และควรสวมถุงมือ ควรล้างน้ำเป็นระยะเวลา 20 นาที ชักเสื้อผ้าและรองเท้าก่อนนำมาสวมใส่
- **ทางปาก** ล้างปาก ถอดฟันปลอมหากมี และดื่มน้ำตามในปริมาณพอสมควร และควรหยุดหากผู้ป่วยมีอาการอยากอาเจียน หากผู้ป่วยมีอาการอาเจียน ควรจัดท่าให้ศีรษะอยู่ต่ำ เพื่อป้องกันไม่ให้สารพิษเข้าสู่ปอด ไม่ควรนำสิ่งต่างๆใส่ปากผู้ป่วย หากผู้ป่วยมีอาการหมดสติ ควรเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปที่อากาศปลอดภัยและถ่ายเท ปลดกระดุมเสื้อ และปรึกษาแพทย์ฉุกเฉินทันที

การเก็บรักษา

เก็บในที่มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร และสัตว์เลี้ยง ควรจัดเก็บให้พ้นแสงแดด สามารถจัดเก็บที่อุณหภูมิห้อง

การบรรจุ

ขนาด	พื้นที่ (ไม่พสน้ำ)
0.1 ลิตร	0.5-1 ตร.ม.