

# น้ำยาจระเข้ ขจัดคราบซีเมนต์ Crocodile Cement Remover



## จระเข้

Innovation for Your Family's Happiness

TILING INNOVATION

## ขจัดคราบซีเมนต์

### คุณสมบัติ

น้ำยาจะทำปฏิกิริยากับคราบปูน, ยาแนว, หรือปูนพองจากการก่อสร้างที่สะสมบนพื้นผิวอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยประหยัดเวลาในการทำความสะอาดพื้นที่ หลังการติดตั้งกระเบื้อง โดยไม่ทำลายพื้นผิวของกระเบื้อง ควรสวมถุงมือทุกครั้งก่อนใช้งาน

## ข้อแนะนำการใช้

### การเตรียมพื้นผิว

พื้นที่ที่ต้องการจะขจัดคราบซีเมนต์ ยาแนว ปูนขาว นั้นต้องแห้งเต็มที่

### อัตราส่วนผสม

กระเบื้องเคลือบเงา และพอร์ซเลน	ผสมน้ำในอัตรา 1 : 10
กระเบื้องดินเผา	ผสมน้ำในอัตรา 1 : 5
พื้นหินธรรมชาติ, หินสังเคราะห์	ผสมน้ำในอัตรา 1 : 10
พื้นหินที่สามารถทนต่อกรดได้	ผสมน้ำในอัตรา 1 : 15

### การใช้งาน

1. ใช้ลงบนพื้นผิวโดยตรง หรือเจือจางด้วยการผสมน้ำ ขึ้นอยู่กับคราบของปูน
2. ต้องแน่ใจว่าคราบปูนที่ต้องการขจัดนั้นแห้งเต็มที่
3. ใช้แปรงทองเหลือง หรือที่ทำความสะอาดที่มีความแข็ง ขจัดคราบปูนบางส่วนออก
4. เหนี่ยวน้ำที่เตรียมไว้ ทิ้งไว้ 4-5 นาที
5. ล้างออกด้วยน้ำเปล่า ถ้าคราบออกไม่เพียงพอ ให้ทำซ้ำ



# น้ำยาจระเข้ ขจัดคราบซีเมนต์ Crocodile Cement Remover



จระเข้  
Innovation for Your Family's Happiness  
TILING INNOVATION

## ข้อมูลทางด้านเทคนิค (Technical Data)

Hydrochloric acid 10 < 15 %  
PH.1

### ข้อควรระวัง

- ไม่ควรใช้ กับพื้นผิวที่ไม่ทนต่อกรด
- ควรทดสอบประสิทธิภาพในพื้นที่เล็กๆ ก่อน
- สวมถุงมือ และแว่นเพื่อป้องกันตลอดเวลา
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง

### การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

- **ทางการเข้าตา** ล้างตาด้วยน้ำเปล่าจำนวนมากทันที และกรอกตาขึ้นลง หากใส่คอนแทคเลนส์ ควรถอดออกอย่างระมัดระวัง และล้างตาด้วยน้ำเปล่าต่ออย่างน้อย 20 นาที และควรปรึกษาแพทย์
- **ทางการสูดดม** เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปที่โล่งและอากาศถ่ายเท หากยังมีควันพุ่งจากสารเคมี ควรสวมใส่หน้ากากในกรณีหมดสติ ควรจัดท่าทางผู้ป่วยอยู่ในท่าที่เหมาะสม คลายกระดูกคอหรือเนคไทด์ ควรเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไป ในสถานที่ปลอดภัย อากาศถ่ายเท และปรึกษาแพทย์ฉุกเฉินทันที
- **ทางผิวหนัง** ล้างสิ่งปนเปื้อนจากผิวหนังด้วยน้ำจำนวนมาก ล้างสารที่ปนเปื้อนเสื้อผ้าด้วยน้ำ และควรสวมถุงมือ ควรล้างน้ำเป็นระยะเวลา 20 นาที ชักเสื้อผ้าและรองเท้าก่อนนำมาสวมใส่
- **ทางปาก** ล้างปาก ถอดฟันปลอมหากมี และดื่มน้ำตามในปริมาณพอสมควร และควรหยุดหากผู้ป่วยมีอาการอยากอาเจียน หากผู้ป่วยมีอาการอาเจียน ควรจัดท่าให้ศีรษะอยู่ต่ำ เพื่อปกป้องไม่ให้สารพิษเข้าสู่ปอด ไม่ควรนำสิ่งต่างๆใส่ปากผู้ป่วย หากผู้ป่วยมีอาการหมดสติ ควรเคลื่อนย้าย ผู้ป่วยไปที่อากาศปลอดภัยและถ่ายเท คลายกระดูกคอ และปรึกษาแพทย์ฉุกเฉินทันที

### การเก็บรักษา

เก็บในที่มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร และ สัตว์เลี้ยง  
ควรจัดเก็บให้พ้นแสงแดด สามารถจัดเก็บที่อุณหภูมิห้อง

### การบรรจุ

ขนาด	พื้นที่ (ไม่พสน้ำ)
0.5 ลิตร	4 ตร.ม.
3.0 ลิตร	24 ตร.ม.
10.0 ลิตร	80 ตร.ม.
20.0 ลิตร	160 ตร.ม.